

POOPERAČNÍ PÉČE

1. umístění zvířete

- po operaci může přetrvávat u vašeho zvířete ospalost a neochota k pohybu po dobu 24–36 hodin. Po tuto dobu umístěte pacienta na klidné suché místo bez průvanu, s optimální teplotou prostředí 15–25 °C. Vždy je lepší mít zvíře pod dohledem v místnosti.
- nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě - zamezíte tím pádu a poranění

2. kontrola sliznic

- během 12 hodin po operaci kontrolujte sliznice psa
- barva sliznic by měla být růžová až slabě červená
- po stlačení tvářové sliznice zmizí barva, její návrat by měl být do dvou až tří sekund

3. voda

- po příchodu domů (pokud je pacient zcela při vědomí) nabídněte malé množství čerstvé vody, toto proveďte několikrát za hodinu
- nenechte vašeho psa vypít velké množství vody najednou – nebezpečí zvracení
- neomezený přístup k vodě umožněte za 2–4 hodiny po prvním podání tekutin

4. potrava

- potravu nabídněte za 5–10 hodin po operaci za předpokladu, že pacient nezvrací
- podávejte malé množství stravitelné potravy
- u štěňat a velmi malých plemen psů začněte podávat potravu co nejdříve
- k normálnímu stravovacímu režimu přejděte 24 hodin po operaci (pokud neurčí lékař jinak)
- potrava by měla být stravitelná, bohatá na aminokyseliny a energii

5. pohybová aktivita

- do vytažení stehů výrazně omezte pohyb pacienta
- procházky by měly probíhat jen na vodítku
- zamezte výskokům a seskokům

6. ochrana operační rány

- je nutné zabránit olizování operační rány – nebezpečí zavlečení infekce a předčasné odstranění stehů
- použijte ochranné límce, ochranné bandáže nebo oblečku. Je možné také využít náhubek vypletený z přední strany prodyšným materiálem.

7. kontrola operační rány

- mírný otok, bolestivost a zarudnutí je v prvních dvou dnech normální
- z rány nesmí vytékat žádný sekret
- po dobu hojení rány psa nekoupejte
- stehy se obvykle vytahují za 10–12 dní, neurčí-li lékař jinak

8. tlumení bolesti

- nepodávejte léky určené pro lidi typu Ibalgin, Acylpyrin, Paralen, Dyklofenac a další – nebezpečí žaludečních vředů, selhání ledvin a krvácivých stavů

KDY KONTAKTOVAT VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

- při prodlouženém probouzení (trvajícím déle než 12 hodin)
- při změně barvy sliznic – šedá, porcelánově bílá
- pokud se objevilo opakované zvracení
- pokud pacient odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a toy plemen 12 hodin
- pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá
- při výskytu větší bolestivosti, naříkání a změn chování zvířete