

ZÁSADY U PACIENTŮ SE STRUVITOVÝMI MOČOVÝMI KAMENY

Obecné zásady

- zvýšte příjem vody. Minimálně 60 ml/kg/24 hodin. Podávejte stravu ve formě kaší nebo polévky. Množství vody odměřujte a podávejte rovnoměrně rozložené do celého dne.
- zvýšte frekvenci močení. Venčete minimálně 5krát denně, venčete i brzy ráno a pozdě večer
- pravidelně nechte vyšetřit moč – kontrola pH a ostatních fyzikálních parametrů
- při nadváze redukovat za pomoci veterináře váhu vašeho zvířete
- u koček použijte speciální podestýlky s indikátorem krve v moči

Specifická opatření

- pokud krmíte domácí stravu omezte příjem bílkovin, hořčíku a fosforu (snížte podíl masa, zvýšte podíl zeleniny a ovoce)
- acidifikace krmiva (po poradě s ošetřujícím lékařem) – jde o přidávání látek, které okyselí krmivo a tím mění i pH moči (chlorid amonný)
- použití komerčních diet – Hill's c/d, s/d, Royal canine Urinary, Specific CCD/FSD/FSW, Eukanuba Struvite Urinary Formula

Další zásady

- nezaměňujte diety pro psy a kočky. Jsou založeny na jiném principu
- psům by na rozdíl od koček neměla být podávána struvitová dieta déle než 6 měsíců
- při delším podávání je vhodné provést kontrolu hladin P, Mg, ALP a močoviny v krvi
- struvitová dieta by se neměla podávat štěňatům, pokud to není nezbytně nutné, mohla by negativně ovlivnit jejich růst, dále psům s insuficiencí ledvin, při graviditě, laktaci, srdečním selháním, při edematózních stavech, hepatopatiích, pankreatitidách

Proces rozpouštění struvitových urolýtů

- podávání diety u psů antibiotická terapie po celou dobu léčby
- provádění pravidelné kontroly 1x měsíčně RTG vyšetření nativ
1x měsíčně bakteriologická kultivace moči
1x měsíčně vyšetřit močový sediment
- průměrná doba rozpouštění tohoto typu krystalů je u koček je 5 týdnů, u psů 10 týdnů
- ukončení terapie - negativní nález na RTG, po té zkrmovat dietu ještě měsíc